


ไข้เลือดออก โรคร้าย ที่มี **ยุงลาย** เป็นพาหะ

www.kapook.com

อาการ

1 ไข้สูงลอย 39-40 องศา
ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ
ประมาณ 4-5 วัน



3 ตับโต กดเจ็บ
บริเวณชายโครง
ข้างขวา

2 อาการเลือดออก ต่ายดำ
อาเจียน มีจุดเลือดออกตามตัว



4 ระบบไหลเวียนเลือด
ผิดปกติ หรืออาการช็อก เกิดในช่วงไข้จะลด
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รอบปากเขียว ชีพจรเบา
และเร็ว ความดันต่ำ



การรักษา

1 ให้ยาลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้
คือพาราเซตามอล



2 ให้สารน้ำชดเชย ให้ดื่มน้ำเกลือแร่
บ่อยๆ ในรายที่ขาดน้ำมากๆ



3 ดูแลการอย่างใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยมีอาการ
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น คลื่นไส้ อาเจียน
ใจสั่น หน้ามืด ในช่วงไข้ลดให้รีบนำส่ง รพ. ทันที

4 ตรวจเกล็ดเลือดและความเข้มข้นเลือด
เพื่อใช้พิจารณาในการให้สารน้ำชดเชย



การป้องกัน

1 ควบคุมสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้มีแหล่ง
เพาะพันธุ์ของยุงลาย เช่น ในบริเวณที่มีน้ำขัง
บ่อน้ำนิ่ง ในแจกันดอกไม้ เป็นต้น

2 ป้องกันส่วนบุคคล ใส่เสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว ใช้ยาฆ่ายุง
ใช้กลั่นกันยุง เป็นต้น



3 ใช้สารเคมีควบคุม ใช้ทรายอะเบท ใช้ยาฆ่า
ลูกน้ำใส่ในบ่อน้ำ ใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่า
ยุงลาย และในที่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข